

SAME SIZE ARTWORK
LEAFLET SIZE: 160 mm x 200 mm
FOLDING SIZE: 40 mm x 200 mm

The diagram illustrates the layout of a pharmaceutical leaflet. It features a central rectangular area for the main content, with a header section at the top and a footer section at the bottom. The top header includes a logo, the product name 'Glenboril LS®', and the subtitle 'Expectorante'. The main content area contains several sections of text, each preceded by a bold heading. To the left of the main content, there is a vertical dimension line indicating a height of 24 mm from the bottom edge to the top of the content area. Above the content area, a horizontal dimension line indicates a width of 40 mm across the top edge. The right side of the main content area has a decorative border consisting of vertical bars of varying heights.

PROSPECTO - INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Glenboril LS®
Expectorante

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento ya que contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, es posible que tenga que volver a leerlo.
- Si tiene preguntas adicionales, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No se lo dé a otras personas, puede producirles algún daño, incluso si sus síntomas son los mismos que los suyos.
- Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico. Esto incluye los posibles efectos secundarios que no figuran en el prospecto.

Qué hay en el prospecto:

1. ¿Qué es Glenboril LS y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de utilizar Glenboril LS?
3. ¿Cómo utilizar Glenboril LS?
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Glenboril LS
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es Glenboril LS y para qué se utiliza?

Forma Farmacéutica: Jarabe
Vía de Administración: Oral

Glenboril LS es un medicamento recetado y consta de tres ingredientes activos, levosalbutamol, clorhidrato de ambroxol y guaifenesina.

El Levosalbutamol pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como broncodilatadores. Los broncodilatadores ayudan a que las vías respiratorias de los pulmones permanezcan abiertas. Esto facilita la entrada y salida de aire. Ayudan a aliviar la opresión en el pecho, las sibilancias y la tos. Se utiliza para tratar problemas respiratorios en personas con asma y afecciones similares. Se usa cuando los niños y los adultos no pueden utilizar un dispositivo inhalador.

El clorhidrato de ambroxol pertenece al grupo terapéutico de preparaciones para la tos y el resfriado, mucolíticos. Se utiliza para tratar la tos productiva asociada con enfermedades de los pulmones y los bronquios.

La guaifenesina pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como expectorantes. Ayuda a aflojar la mucosidad (flema) de los pulmones y facilita la tos.

Glenboril LS está indicado para el alivio sintomático en el tratamiento de la tos productiva asociada con diversos trastornos respiratorios que incluyen, entre otros, bronquitis aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica (EABC), neumonía y bronquitis asmática.

2. ¿Qué necesita saber antes de utilizar Glenboril LS?

No use Glenboril LS:

- Si es alérgico (hipersensible) al sulfato de levosalbutamol, clorhidrato de ambroxol, guaifenesina o cualquiera de los demás componentes de Glenboril LS.
- Si está tomando cualquier otro medicamento para la tos y el resfriado.
- Si el paciente es menor de 6 años.

Si se encuentra en alguna de estas situaciones, consulte a un médico o farmacéutico antes de utilizar Glenboril LS.

Advertencias y precauciones:

Consulte a su médico, enfermera o farmacéutico antes de tomar Glenboril LS:

- Si tiene la tensión arterial alta

3. ¿Cómo utilizar Glenboril LS?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por el médico. Consulte a su médico, enfermera o farmacéutico si tiene alguna duda.

La dosis recomendada es:

- Adultos y niños mayores de 12 años: 10 ml (2 cucharaditas) tres veces al día.

PE67123 EC

ICONOGRAPHICS CODE: E39562

PANTONE SHADE
PROCESS BLACK
Supersedes Artwork Code: PE66176

PHARMACODE: 123

SAME SIZE ARTWORK
LEAFLET SIZE: 160 mm x 200 mm
FOLDING SIZE: 40 mm x 200 mm

- Niños de 6 a 12 años: 5 mL (1 cucharadita) tres veces al día.
- No se recomienda en niños menores de 6 años.

Si toma más Glenboril LS del que debiera

Si ha ingerido una cantidad excesiva del medicamento, contacte un médico o al servicio de urgencias (Urgencias) más cercano, lleve este prospecto y el envase.

Si toma una cantidad mayor a la que debía, consulte a un médico lo antes posible.

Pueden ocurrir los siguientes efectos:

- Su corazón late más rápido de lo habitual
- Se siente tembloroso
- Hiperactividad
- Vómito
- Acumulación de ácido en su cuerpo que puede hacer que su respiración sea más rápida.
- Malestar gastrointestinal
- Náuseas
- Somnolencia

Estos efectos suelen desaparecer en unas pocas horas.

Si olvidó utilizar Glenboril LS

Solo debe administrar este medicamento según sea necesario siguiendo cuidadosamente las instrucciones de dosificación anteriores. Si olvidó administrar una dosis, administre la siguiente dosis cuando sea el momento. No tome una dosis doble.

Si interrumpe Glenboril LS

Consulte a su médico antes de suspender este medicamento.
Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que ocurre con todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de utilizar el medicamento y busque ayuda de inmediato:

- Reacciones alérgicas que incluyen erupciones cutáneas (que pueden ser graves e incluyen ampollas y descamación), urticaria y picazón.

Informe a su médico si tiene alguno de los siguientes efectos secundarios que pueden ocurrir con este medicamento:

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):

- Náuseas
- Cambio en el sentido del gusto
- Adormecimiento de la boca y la garganta (hipoestesia)

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- Vómito
- Boca seca
- Diarrea
- Enfermedad digestiva (dispepsia)
- Dolor abdominal
- Fiebre

Raras (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas):

- Reacciones de hipersensibilidad (reacciones alérgicas)
 - Erupción cutánea, urticaria (áreas de la piel con picazón)
- Frecuencia desconocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles):
- Reacciones anafilácticas que incluyen shock anafiláctico (una reacción alérgica generalizada y muy grave), angioedema (inflamación de la piel, tejido subcutáneo, mucoso o submucoso que se desarrolla rápidamente) y prurito (picazón)
 - Reacciones adversas cutáneas graves (incluido eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidémica tóxica y pustulosis exantemática aguda generalizada)
 - Garganta seca

Los otros efectos que pueden ocurrir incluyen:

- Dolor o malestar estomacal
- Hipopotasemia (disminución de los niveles séricos de potasio), palpitations (sensaciones incómodas del corazón latiendo fuerte, rápido o irregularmente), temblores finos del músculo esquelético (particularmente la mano) y calambres musculares
- Nerviosismo, dolor de cabeza, mareos, fatiga e insomnio

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta efectos secundarios, consulte a su médico o farmacéutico. Esto incluye los posibles efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. A través del reporte de los efectos secundarios, puede ayudar a obtener más información sobre la seguridad de este medicamento.

Para reportar cualquier evento adverso o una queja de producto, envíanos un correo a PV.WestLATAM@glenmarkpharma.com

5. Conservación de Glenboril LS

Consérvese a temperatura no mayor a 30°C.

6. Contenido del envase e información adicional

Presentaciones Comerciales:

Caja x 1 frasco x 100 ml más inserto.

Composición cualitativa y cuantitativa:

Cada 10 ml contiene
Sulfato de levosalbutamol
Equivalente a levosalbutamol.....1 mg
Clorhidrato de Ambroxol.....30 mg
Guaifenesina.....100 mg

Excipientes: Monohidrato de ácido cítrico, benzoato de sodio, citrato de sodio, cloruro de sodio, sacarosa, hidroxipropilmelcelulosa 6 cps, sabor mango supremo, sabor menta fresca especial 521-00159-02, enmascarante 2522, mentol (levomentol) y agua purificada.

Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

ICONOGRAPHICS CODE: E39562

PANTONE SHADE
 PROCESS BLACK
Supersedes Artwork Code: PE66176

EC
PE67123

Fabricado por:
Glenmark PHARMACEUTICALS LTD.
Village Kishanpura, Baddi Nalagarh Road,
Tehsil Baddi, Distt Solan (H.P) 173205,
Baddi, India

En Ecuador:
Importado y Distribuido por:
Glenmark-Pharmaceuticals Ecuador S.A.
Av. Simón Bolívar y Calle Nayón.
Centro Corporativo Ekopark Quito-Ecuador

Este folleto se preparó en mayo 2021

PHARMACODE: 123