

SAME SIZE ARTWORK
LEAFLET: 360 mm x 300 mm
FOLDING SIZE: 30 mm x 150 mm

30 mm

25 mm

COMBIWAVE™

SF 125/250

Salmeterol + Fluticasona Propionato
25 mcg + 125/250 mcg/ Dosis
Suspensión para inhalación.
Libre de CFC

Leer todo el inserto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante sobre su uso.
• Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
• Este medicamento ha sido diseñado sólo para usted, no debe dárselo a otras personas.
• Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este inserto.

Contenido del inserto:

1. ¿Qué es Combiwave SF 125/250 y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar Combiwave SF 125/250?
3. ¿Cómo usar Combiwave SF 125/250?
4. ¿Qué efectos secundarios puede experimentar?
5. ¿Cuáles son las precauciones especiales de conservación?
6. Contenido del empaque e información adicional

1.- **¿Qué es Combiwave SF 125/250 y para qué se utiliza?**
Combiwave SF 125/250 contiene dos principios activos, salmeterol y fluticasona propionato.
• Salmeterol es un broncodilatador de larga duración. Los broncodilatadores ayudan a mantener abiertas las vías respiratorias del pulmón, haciendo más fácil la entrada y salida de aire. Los efectos duran al menos 12 horas.
• Fluticasona propionato es un corticosteroide que disminuye la inflamación e irritación de los pulmones.

El médico le ha prescrito este medicamento para ayudar a prevenir los problemas respiratorios tales como el asma.

Usará debe utilizar Combiwave SF 125/250 todos los días como le ha recomendado su médico. Esto asegurará que la medicación actúe correctamente en el control de su asma.

Combiwave SF 125/250 ayuda a prevenir la falta de aliento y sibilancias.
Sin embargo, Combiwave SF 125/250 no se debe utilizar para aliviar un ataque repentino de ahogo o sibilancias. En tal caso, usted tiene que utilizar su medicamento de "rescate" de acción rápida, como salbutamol, para aliviar el ataque. No se debe usar Combiwave SF 125/250 para aliviar un ataque repentino de ahogo o sibilancias.

2.- **¿Qué necesita saber antes de empezar a usar Combiwave SF 125/250?**
• Use Combiwave SF 125/250 exactamente como se le ha indicado.
• Si está tomando otro medicamento, informe a su médico, a su farmacéutico o al farmacéutico (HFA 134e).

Advertencias y precauciones

- No empiece a usar Combiwave SF 125/250 si tiene:
 - Alteraciones cardíacas, incluyendo latido cardíaco rápido o irregular.
 - Hipertensión arterial.
 - Infección de la garganta (como la amigdalitis o la faringitis).
 - Infección de la nariz (como la sinusitis).
 - Niveles bajos de potasio en sangre.
 - Tuberculosis (TB) actualmente o en el pasado u otras infecciones del pulmón.
- Póngase en contacto con su médico si presenta visión borrosa u otras alteraciones visuales.

Otros medicamentos y Combiwave SF 125/250

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluyendo aquellos medicamentos para el asma o los alérgicos sin receta. El motivo es que, en algunos casos, los medicamentos pueden interactuar entre sí. Informe a su médico si usted toma alguno de los siguientes medicamentos, antes de empezar a utilizar Combiwave SF 125/250:

- Colchicina (para el dolor, como el reumatismo, la gota). Los colchicinas son utilizadas en su mayor parte para tratar la hinchazón (por ejemplo, las afecciones cardíacas).
- Medicamentos para tratar infecciones (como ketoconazol, itraconazol y eritromicina) incluyendo algunos medicamentos para el VIH (como ritonavir, zalcitabina). Algunos de estos medicamentos pueden aumentar la cantidad de fluticasona propionato o salmeterol en su cuerpo.
- Combiwave SF 125/250, incluyendo latidos del corazón irregulares, o pueden empeorar los efectos adversos. Por lo que su médico podría hacerle controles minuciosos si está tomando estos medicamentos.
- Ciertos medicamentos (como los diuréticos). Si usted ha tomado estos medicamentos recientemente, puede aumentar el riesgo de que este medicamento afecte a su glándula suprarrenal.
- Durelitos, también conocidos como medicamentos para orinar, usados para tratar la hipertensión.
- Otros broncodilatadores (como salbutamol).
- Medicamentos que contienen cafeína. Se usan a menudo para tratar el asma.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en período del lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No es probable que Combiwave SF 125/250 afecte a la capacidad de conducir o usar máquinas.

3.- ¿Cómo usar Combiwave SF 125/250?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

- **Uso de Combiwave SF 125/250** todos los días, hasta que su médico le indique que deje de hacerlo. No use más de la dosis recomendada. En caso de duda, consulte a su médico.
- No deje de usar Combiwave SF 125/250 ni reduzca su dosis sin hablar antes con su médico.
- Combiwave SF 125/250 debe inhalarse a través de la boca hasta los pulmones.

Adultos y adolescentes de 12 años en adelante

- Combiwave SF 25+125 microgramos 2 aplicaciones dos veces al día
- Combiwave SF 25+250 microgramos 2 aplicaciones dos veces al día

Niños de 4 a 12 años de edad

- Combiwave SF 125/250 no está recomendado para uso en niños menores de 4 años de edad

Sus síntomas pueden llegar a estar bien controlados usando Combiwave SF 125/250 dos veces al día. Si se así, su médico podrá decidir disminuir su dosis a una vez al día. La dosis puede cambiar a:

- una vez por la noche si tiene síntomas nocturnos.
- una vez por la mañana si tiene síntomas diurnos.

Es muy importante que siga las instrucciones de su médico sobre cuántas aplicaciones y con qué frecuencia debe administrarse.

Si está utilizando Combiwave SF 125/250 para tratar el asma, su médico querrá vigilar regularmente sus síntomas.

Si su asma empeora o tiene mayor dificultad para respirar, acuda a su médico enseguida. Puede notar más sibilancias o sensación de ahogo más a menudo o que tenga que utilizar su medicamento de rescate de acción rápida con más frecuencia. Si le ocurre cualquiera de estas cosas, debe continuar utilizando Combiwave SF 125/250, pero no deje de usar su medicamento de rescate de acción rápida. Si los síntomas continúan empeorando, acuda a su médico, porque puede que necesite un tratamiento adicional.

Instrucciones de uso

- Su médico, enfermero o farmacéutico deberán enseñarle cómo utilizar su inhalador. Periodicamente deberán verificar cómo lo utiliza. El no utilizar Combiwave SF 125/250 correctamente puede afectar a su eficacia.
- Durante la inhalación es preferible que se encuentre de pie o sentado. El inhalador está diseñado para usarlo de forma vertical.

Verificación del inhalador

Antes de usar el inhalador por primera vez, asegúrese de que el inhalador, quite la tapa de la boquilla, agite bien el inhalador calculando su pulgar en la base del inhalador, debajo de la boquilla, dirija la boquilla lejos de usted y presione el cartucho hacia abajo para liberar una pulverización al aire.

El inhalador se debe agitar inmediatamente antes de cada inhalación. Si ha pasado un tiempo o más, se usará el inhalador, quite la tapa de la boquilla, agite bien el inhalador y libere dos pulverizaciones al aire.

Uso del inhalador

1. Quite la tapa de la boquilla, presione con cuidado los dedos

2. Verifique que por dentro y por fuera de la boquilla no haya ninguna partícula extraña.

3. Agite bien el inhalador para asegurar la eliminación de cualquier partícula extraña y la mezcla adecuada del contenido del inhalador.

4. Sujete el inhalador en posición vertical entre los dedos índice y el pulgar, colocando el pulgar en la base del inhalador por debajo de la boquilla.

5. Exhale tanto aire como pueda y coloque la boquilla del inhalador entre los dientes. Cierre los labios alrededor de la boquilla. No debe morder la boquilla.

6. Inmediatamente después de comenzar a tomar aire, presione firmemente la parte superior del inhalador para liberar Combiwave SF 125/250, y continúe tomando aire profunda y constantemente.

7. Mientras continúa la respiración, debe retirar el inhalador de la boca cuando el flujo de la parte superior del inhalador. Continúe aguantando la respiración unos segundos, tanto como se pueda.

8. Para tomar una segunda inhalación, el paciente debe mantener el inhalador de manera vertical y esperar medio minuto antes de repetir los pasos 3 a 7.

9. El paciente debe volver a colocar inmediatamente la tapa de la boquilla a su posición correcta, presionar firmemente hasta que se escuche un "clac".

Colocar la tapa no requiere fuerza excesiva y un "clac" se escuchará al colocarla en su lugar.

IMPORTANTE
El inhalador debe ser utilizado correctamente. Es importante iniciar la respiración tan lentamente como se pueda, justo antes de pulsar el inhalador. Es aconsejable que el paciente practique en el espejo las primeras veces. Si observan una "resaca de nariz" saliendo por la parte superior del inhalador o por los labios de la boca, esto indica que el paciente no está inhalando correctamente.

El paciente debe enjuagarse la boca con agua y escupirla. Y/o cepillarse los dientes después de cada dosis administrada, con el fin de minimizar el riesgo de candidiasis orofaríngea y resequedad.

Los cuidadores se deben asegurar que los niños estén usando Combiwave SF 125/250 usen correctamente la técnica de inhalación descrita anteriormente.

Si a usted o a su hijo les resulta difícil utilizar el inhalador, su médico, enfermero u otro profesional sanitario podría recomendar el uso del inhalador COMBIWAVE SF 125/250 con una cámara de inhalación.

Se pueden utilizar cámaras de inhalación (dependiendo de las recomendaciones nacionales). Los pacientes deben ser instruidos en el uso y el cuidado apropiado del inhalador y la cámara. Igualmente se debe contrastar la forma de empleo para asegurarse de que la cantidad óptima del fármaco inhalado llegue a los pulmones. Los pacientes

COMBIWAVE CODE E8664

PANTONE SHADE
PANTONE Process Black C
Supersedes Artwork Code:

PHARMACODE: 892

FE09592 PE/EC

PHARMACODE: 692