

En Ecuador:
Importado y Distribuido por:
Glenmark-Pharmaceuticals Ecuador, S.A.
 Centro Corporativo EXPCAR- Av. Simon Bolívar y Calle Nayaón Quito-Ecuador

Trastornos genéticos y condiciones de uso donde se observaron los efectos adversos	Prevalencia	Frecuencia
Asimetría facial, malestar, edema	Común	No común

Monteluzitina:
a) Síntomas:
 No hubo eventos adversos en la mayoría de los reportes de sobredosis. Los eventos adversos que ocurrieron con mayor frecuencia fueron consistentes con los reportados en la literatura: náusea, vómitos, dolor de cabeza, somnolencia, sed, dolor de cabeza, vómitos e hipersensibilidad picaemática.
b) Manejo de las sobredosis:
 No hay información específica sobre el tratamiento de la sobredosis con monteluzitina. Se desconoce si monteluzitina es dializable por dilatación plasmática o por hemólisis. Si ocurre sobredosis, se recomienda tratamiento sintomático o de soporte.

En India:
Importado y Distribuido por:
Glenmark-Pharmaceuticals LTD
 Village Kishanpura, Badli-Katpura Road, Tehsil Badli, District Gurgaon, Haryana 122 020, India.
 © Marca Registrada

Trastornos genéticos y condiciones de uso donde se observaron los efectos adversos	Prevalencia	Frecuencia
Asimetría facial, malestar, edema	Común	No común

Monteluzitina:
a) Síntomas:
 Los eventos adversos de sobredosis pueden incluir visión doble en adultos y agitación e inquietud inusualmente; también visión doble en niños.
b) Manejo de las sobredosis:
 No se conoce antídoto específico para Monteluzitina. Se recomienda el tratamiento sintomático o de soporte. Se debe considerar lavado gástrico luego de la ingesta a corto plazo. Monteluzitina no se elimina efectivamente mediante hemodíalisis. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

En India:
Importado y Distribuido por:
Glenmark-Pharmaceuticals LTD
 Village Kishanpura, Badli-Katpura Road, Tehsil Badli, District Gurgaon, Haryana 122 020, India.
 © Marca Registrada

Trastornos genéticos y condiciones de uso donde se observaron los efectos adversos	Prevalencia	Frecuencia
Asimetría facial, malestar, edema	Común	No común

Monteluzitina:
a) Síntomas:
 Los eventos adversos de sobredosis pueden incluir visión doble en adultos y agitación e inquietud inusualmente; también visión doble en niños.
b) Manejo de las sobredosis:
 No se conoce antídoto específico para Monteluzitina. Se recomienda el tratamiento sintomático o de soporte. Se debe considerar lavado gástrico luego de la ingesta a corto plazo. Monteluzitina no se elimina efectivamente mediante hemodíalisis. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

En India:
Importado y Distribuido por:
Glenmark-Pharmaceuticals LTD
 Village Kishanpura, Badli-Katpura Road, Tehsil Badli, District Gurgaon, Haryana 122 020, India.
 © Marca Registrada

Trastornos genéticos y condiciones de uso donde se observaron los efectos adversos	Prevalencia	Frecuencia
Asimetría facial, malestar, edema	Común	No común

Monteluzitina:
a) Síntomas:
 Los eventos adversos de sobredosis pueden incluir visión doble en adultos y agitación e inquietud inusualmente; también visión doble en niños.
b) Manejo de las sobredosis:
 No se conoce antídoto específico para Monteluzitina. Se recomienda el tratamiento sintomático o de soporte. Se debe considerar lavado gástrico luego de la ingesta a corto plazo. Monteluzitina no se elimina efectivamente mediante hemodíalisis. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

En India:
Importado y Distribuido por:
Glenmark-Pharmaceuticals LTD
 Village Kishanpura, Badli-Katpura Road, Tehsil Badli, District Gurgaon, Haryana 122 020, India.
 © Marca Registrada

Trastornos genéticos y condiciones de uso donde se observaron los efectos adversos	Prevalencia	Frecuencia
Asimetría facial, malestar, edema	Común	No común

Monteluzitina:
a) Síntomas:
 Los eventos adversos de sobredosis pueden incluir visión doble en adultos y agitación e inquietud inusualmente; también visión doble en niños.
b) Manejo de las sobredosis:
 No se conoce antídoto específico para Monteluzitina. Se recomienda el tratamiento sintomático o de soporte. Se debe considerar lavado gástrico luego de la ingesta a corto plazo. Monteluzitina no se elimina efectivamente mediante hemodíalisis. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

En India:
Importado y Distribuido por:
Glenmark-Pharmaceuticals LTD
 Village Kishanpura, Badli-Katpura Road, Tehsil Badli, District Gurgaon, Haryana 122 020, India.
 © Marca Registrada

Trastornos genéticos y condiciones de uso donde se observaron los efectos adversos	Prevalencia	Frecuencia
Asimetría facial, malestar, edema	Común	No común

Monteluzitina:
a) Síntomas:
 Los eventos adversos de sobredosis pueden incluir visión doble en adultos y agitación e inquietud inusualmente; también visión doble en niños.
b) Manejo de las sobredosis:
 No se conoce antídoto específico para Monteluzitina. Se recomienda el tratamiento sintomático o de soporte. Se debe considerar lavado gástrico luego de la ingesta a corto plazo. Monteluzitina no se elimina efectivamente mediante hemodíalisis. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

En India:
Importado y Distribuido por:
Glenmark-Pharmaceuticals LTD
 Village Kishanpura, Badli-Katpura Road, Tehsil Badli, District Gurgaon, Haryana 122 020, India.
 © Marca Registrada

Trastornos genéticos y condiciones de uso donde se observaron los efectos adversos	Prevalencia	Frecuencia
Asimetría facial, malestar, edema	Común	No común

Monteluzitina:
a) Síntomas:
 Los eventos adversos de sobredosis pueden incluir visión doble en adultos y agitación e inquietud inusualmente; también visión doble en niños.
b) Manejo de las sobredosis:
 No se conoce antídoto específico para Monteluzitina. Se recomienda el tratamiento sintomático o de soporte. Se debe considerar lavado gástrico luego de la ingesta a corto plazo. Monteluzitina no se elimina efectivamente mediante hemodíalisis. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

En India:
Importado y Distribuido por:
Glenmark-Pharmaceuticals LTD
 Village Kishanpura, Badli-Katpura Road, Tehsil Badli, District Gurgaon, Haryana 122 020, India.
 © Marca Registrada

Trastornos genéticos y condiciones de uso donde se observaron los efectos adversos	Prevalencia	Frecuencia
Asimetría facial, malestar, edema	Común	No común

Monteluzitina:
a) Síntomas:
 Los eventos adversos de sobredosis pueden incluir visión doble en adultos y agitación e inquietud inusualmente; también visión doble en niños.
b) Manejo de las sobredosis:
 No se conoce antídoto específico para Monteluzitina. Se recomienda el tratamiento sintomático o de soporte. Se debe considerar lavado gástrico luego de la ingesta a corto plazo. Monteluzitina no se elimina efectivamente mediante hemodíalisis. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

En India:
Importado y Distribuido por:
Glenmark-Pharmaceuticals LTD
 Village Kishanpura, Badli-Katpura Road, Tehsil Badli, District Gurgaon, Haryana 122 020, India.
 © Marca Registrada

Trastornos genéticos y condiciones de uso donde se observaron los efectos adversos	Prevalencia	Frecuencia
Asimetría facial, malestar, edema	Común	No común

Monteluzitina:
a) Síntomas:
 Los eventos adversos de sobredosis pueden incluir visión doble en adultos y agitación e inquietud inusualmente; también visión doble en niños.
b) Manejo de las sobredosis:
 No se conoce antídoto específico para Monteluzitina. Se recomienda el tratamiento sintomático o de soporte. Se debe considerar lavado gástrico luego de la ingesta a corto plazo. Monteluzitina no se elimina efectivamente mediante hemodíalisis. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

En India:
Importado y Distribuido por:
Glenmark-Pharmaceuticals LTD
 Village Kishanpura, Badli-Katpura Road, Tehsil Badli, District Gurgaon, Haryana 122 020, India.
 © Marca Registrada

Trastornos genéticos y condiciones de uso donde se observaron los efectos adversos	Prevalencia	Frecuencia
Asimetría facial, malestar, edema	Común	No común

PANTONE SHADE	 PANTONE BLACK PROCESS C	Supersedes Artwork Code: PE55208
---------------	--	--

PHARMACODE: 876