

SAME SIZE ARTWORK  
LEAFLET SIZE: 140 mm x 176 mm

20 mm

22 mm  
22 mm

- aumento de sensibilidad de la piel (especialmente al frío y al calor)
- hormigueo en la piel
- erupción
- infección local de la piel independientemente de causa específica que incluye, pero no se limita a: folículos pilosos inflamados o infectados, herpes labial, infecciones generalizadas por herpes simple
- enrojecimiento facial o irritación de la piel después de beber alcohol.

**Poco común (pueden afectar a menos de 1 de cada 100 personas):**

- acné
- El impétigo, una infección cutánea bacteriana superficial que suele producir ampollas o llagas en la piel, se ha informado en niños.
- Rosácea (enrojecimiento facial), dermatitis similar a la rosácea, lento (presencia de manchas marrones planas en la piel), edema en el sitio de aplicación e infecciones oculares por herpes se han informado durante la experiencia posterior a la comercialización.

**Informe de efectos secundarios**

Si usted sufre algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente vía Email a:

PV.WestLATAM@glenmarkpharma.com

Al informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

**CONSERVACIÓN:**

Conservar a temperatura no superior a 30° C. No congelar. No utilice Tacroz después de la fecha de caducidad que aparece en el tubo.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

**PRESENTACIONES:**

Caja con tubo para 5g, 10g, 15g y 30g más inserto.

**En Ecuador:**

Importado y distribuido por:

Glenmark - Pharmaceuticals Ecuador, SA  
Centro Corporativo EKOPARK Av. Simón Bolívar y Calle Nayón  
Quito, Ecuador

Fabricado por:

**Glenmark PHARMACEUTICALS LTD.**  
At: Plot No. E-37, 39,  
D-Road MIDC Area,  
Satpur, Nashik - 422 007,  
Maharashtra, India.  
TM Trade Mark

EC  
PE65663

Este prospecto fue revisado por última vez en Mayo 2023.

**Tacroz™ Ungüento**

**Tacroz™ Forte Ungüento**



**Composición:**

**Tacroz Ungüento**

Cada 100 g de ungüento contienen:

Tacrolimus USP 0,03 g (0,03%)

Excipientes: parafina blanda blanca, parafina líquida, carbonato de propileno, cera de abeja blanca y parafina dura.

**Tacroz Forte Ungüento**

Cada 100 g de Ungüento contienen:

Tacrolimus USP 0,10 g (0,1%)

Excipientes: parafina blanda blanca, parafina líquida, carbonato de propileno, cera de abeja blanca y parafina dura.

**Forma farmacéutica: Ungüento**

**Vía de administración: Tópica**

**¿QUÉ ES TACROLIMUS Y PARA QUÉ SIRVE?**

Tacrolimus es un agente inmunomodulador que altera la respuesta inmune anormal y alivia la inflamación de la piel y la picazón.

**Indicaciones terapéuticas**

Tacrolimus está indicado para tratar la dermatitis atópica (eczema) de moderada a grave en adultos que no responden adecuadamente o son intolerantes a los tratamientos convencionales, como los corticosteroides tópicos, y en niños (a partir de los 2 años) que no respondieron adecuadamente a los tratamientos convencionales, como corticoides tópicos.

**DOSIFICACIÓN**

**Tratamiento de inicio (eczema)**

Adultos y adolescentes a partir de los 16 años: Tacrolimus 0,03% o 0,1% dos veces al día. Su médico decidirá qué concentración es mejor para usted.

Generalmente se inicia tratamiento con Tacrolimus 0,1% ungüento dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche, hasta que desaparezca el eczema. Dependiendo de la respuesta de su eczema, su médico decidirá si se puede reducir la frecuencia de aplicación o se puede usar la tacrolimus al 0,03% de concentración más baja.

La mejora generalmente se ve dentro de una semana. Si no ve ninguna mejora después de dos semanas, consulte a su médico acerca de otros posibles tratamientos.

Niños (2-15 años): Tacrolimus 0,03% dos veces al día con un máximo de tres semanas

**Tratamiento de mantenimiento**

Adultos y adolescentes a partir de los 16 años: Tacrolimus 0,03% o 0,1% se debe aplicar una vez al día, dos veces por semana (p.

ICONOGRAPHICS CODE: E38883

**PANTONE SHADE**



PANTONE  
BLACK  
PROCESS C

**Supersedes  
Artwork code**

PHARMACODE: 663